Mémoire sur l'Extraction d'un humerus faite à Givet, par Gilly Chirurgien major de l'hôpital ~~de~~

le 23 8bre 1783 } Un jeune homme de 13. à 14 ans, des Environs de cette ville; eut, à la suite d'une Chûte, une tumeur, à la partie supérieure du bras, à Coté de la Cavité Glénoïde: Cette tumeur s'Etant abcédée s'ouvrit d'Elle même. il en Est sorti, pendant un mois quantité de Matière. Comme le Blessé n'eut point d'abord Recours aux maîtres de l'art, il fut pensé par ses parens, gens sans Connaissance, et qui négligèrent tellement ce jeune homme, qu'environ six semaines après, on s'aperçût que la tête de l'os sortait par la playe, à chaque pensement. Mr Gillot d'hon, Commissaire ordonnateur des guerres ayant passé par l'Endroit où demeurait le Blessé on lui parla de ce fait Extraordinaire; à son Retour En ville, il me fit l'honneur de m'en parler, et de me demander les moyens de secourir ce jeune homme, qu'il fit amener En ville, et l'ayant lui même suivi, jusque Chez moi, nous l'Examinâmes En sa présence; nous trouvâmes les Bords de la playe fort calleux, l'os carié, dépouillé de son périoste, et détaché des muscles, qui servent au Bras à faire tous ses mouvemens. ayant Essayé de le détacher, nous le tirâmes sans Effort, à peu près comme on tire un Couteau de sa gaine. Cet os Etait carié, et même vermoulu à la partie qui tient au Condyle, quoique le Coude ne fut pas absolument gorgé. Je Commençai par Rafraichir les bords de la playe, j'en fis une nouvelle à la partie

inférieur du Bras à côté du condyle que je trouvai carié, et où je découvris un corps solide, que l'on peut regarder comme un nouvel humerus formé par la nature : la playe supérieure a été pansée ~~par un~~ avec un digestif animé, le bras couvert de compresses imbibées dans une fomentation vulnéraire ; la playe inférieure, avec des bourdonnets trempés dans la teinture de mirrhe et d'aloës. Ces pansements ont été continués par Mr Pommayrac chirurgien aidemajor de l'hôpital qui est parvenu à cicatriser la playe supérieure en très-peu de tems ; la suppuration de l'autre fort abondante et entrainant avec elle toujours quelques esquilles, réunit enfin le Bras dans son état naturel de sorte qu'environ six semaines après l'extraction de cet humerus, cet enfant s'est trouvé en état de retourner chez ses parents, lui ayant seulement mis un emplâtre à l'endroit de la cicatrice et il s'est depuis présenté deux fois, et j'ai trouvé chaque fois beaucoup de diminution au coude ; enfin je l'ai vu depuis peu parfaitement guéri, et se sert de son bras. fait à Gisors le 2 9bre février 1785.

Gilly

Nécrose

n.° 5

ARC 39 n°212